# Rivierrombout

| | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwetsbaar in water en zandoevers | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

Over leefgebied en cyclus is veel onduidelijk, dus rivierrombout kan voorkomen op onverwachte plekken!


Luc Bruinsma

**Leefgebied** langs grote rivieren (bijvoorbeeld de Lek, Nieuwe Maas en IJssel), op zandstrandjes tussen de kribben


Maikel Aragon van den Broeke

**Voortplanting** gebeurt in de directe omgeving van de rivier


Maikel Aragon van den Broeke

**Eieren** worden in open water afgezet en komen vermoedelijk na overwintering in juni-juli uit


Vlinderstichting – Christophe Brochard

**Larven** leven op zandstrandjes bij ondiepe, onbegroeide, langzaam stromende rivieren, waar ze zich ingraven; hun ontwikkeling kan 3-4 jaar duren


Berto van Dam

**De soort** 50-55mm groot, vrijwel geheel doorlopende gele lengtestreep op het achterlijf. Borststuktekening bestaat uit brede zwarte strepen.


Berto van Dam

**Uitsluipen** gebeurt van eind mei tot half augustus. De **vliegtijd** is tot eind september.

**Wat doe je als je deze soort tegenkomt of verdenkt? Ecoloog bellen + registreren + habitat sparen + check EWP!**

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

TAUW