Zwarte stern

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Broedtijd												

Let op: deze soort is gevoelig voor afname van krabbenscheer. Krabbenscheer zelf is kwetsbaar voor verstoringen van de water- en oeverkwaliteit


Bram Rijksen

Komt voor in ondiepe en matig voedselrijke moerassen en in agrarische gebieden met veel sloten, moerasvegetatie en modderbanken


Michiel Wilhelm

Zwarte Sterns broeden op krabbenscheer en zijn daardoor kwetsbaar voor afname van deze plantensoort.


Michiel Wilhelm


Zwarte Sterns zijn in Nederland te zien van half april tot het einde van september. De soort overwintert in West-Afrika.


Michiel Wilhelm

Zwarte sterns foerageren niet ver van de kolonies op kleine visjes, amfibieën, insecten en regenwormen


Berto van Dam

De soort heeft een zwart grijs verenkleed tot 20 a 25 cm groot.


Bram Rijksen

Kunstmatige eilandjes zorgen voor extra broedgelegenheid in de Krimpenerwaard

Wat doe je als je deze soort tegenkomt of verdenkt? Ecoloog bellen + registreren + habitat sparen + check EWP!

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

TAUW